




KAUNO
KLINIKOS

RADIOLOGIJOS KLINIKA TOMOGRAFIJŲ SKYRIUS PASIRUOŠIMAS KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS (KT) TYRIMAMS



KAUNO
KLINIKOS



PASIRUOŠIMAS KT TYRIMUI




SPECIALUS PARUOŠIMAS
NEREIKALINGAS ATLIEKANT
– GALVOS, KAKLO, KRŪTINĖS,
STUBURO, GALŪNIŲ
TYRIMUS

ATLIEKANT PILVO TYRIMUS
BENT 4 VAL IKI TYRIMO
NEVALGYTI



ATLIKTI KREATININO KIEKIO
KRAUJYJE TYRIMĄ





PASIRUOŠIMAS ŠIRDIES KRAUJAGYSLIŲ KT TYRIMUI




Jei ŠSD ramybėje >60 k/min,
tyrimo dieną suvartoti beta
blokatorių arba ivabradino
(gydytojo paskyrimu).

12 val. iki tyrimo nevartoti kavos
ar kitų kofeino turinčių gėrimų,
nerūkyti.



Siekiant užtikrinti adekvačią
hidraciją, iki tyrimo neribojamas
kofeino neturinčių skysčių
vartojimas. Pacientas turi išgerti
savo įprastinius vaistus.





KONTRASTINĖ MEDŽIAGA KT TYRIMO METU

- Kontrastinė medžiaga gali būti skiriama geriamu pavidalu arba leidžiama intraveniškai.
- Kompiuterinės tomografijos kontrastinės medžiagos pagrindą sudaro jodo preparatas. Pacientams, kurie turi alergiją jodui, tyrimas be specialaus paruošimo neatliekamas!



Kontrastinės medžiagos sukeliami pojūčiai:

Karščio/šilumos
pojūtis kūne

Kartumas,
metalo skonis
burnoje

Trumpalaikis
šleikštulys,
pykinimas

Jausmas tarsi
apsišlapinus

Skausmas
kateterio vietoje



KO TIKĖTIS KT TYRIMO METU?

KO TIKĖTIS KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS METU?

1

GALI PRIREIKTI
KONTRASTINĖS
MEDŽIAGOS, KURI
PAGERINA VAIZDO
VIZUALIZACIJĄ



2

REIKĖS
ATSIGULTI ANT
SPECIALAUS
APARATO STALO



3

STALAS
ĮVAŽIUOJA Į
SKENAVIMO
ANGĄ



4

APVALI APARATO DALIS
TRIUKŠMINGAI SUKASI
APLINK



ŠALUTINIS POVEIKIS

INFORMUOTI PERSONALĄ JEIGU PO TYRIMO PASIREIŠKĖ:



Paraudimas, patinimas, ašarojimas, niežulys,
pykinimas, svaigulys, kvėpavimo sutrikimas



Jei simptomai pasireiškė po tyrimo praėjus ilgesniam
laiko tarpui, simptomai sunkūs ir nepadeda
medikamentai, **kreiptis į skubios pagalbos skyrių!**